

人性化护理模式在肝癌患者根治术术后护理中的应用

王海英

云南省第一人民医院感染疾病科及肝病科 云南昆明

【摘要】目的 探究人性化护理模式在肝病患者的临床护理工作中的应用效果。**方法** 随机抽取我院2019年12月~2020年5月收治的68例肝病患者作为研究主体,采用数字随机法将其分为研究组与参照组,每组建制34例。给予参照组常规护理干预,研究组采用人性化护理模式,比较两组的护理满意度、不良反应发生率、并发症发生率。**结果** 实施相应护理措施前,两组患者的护理满意度、不良反应发生率、并发症发生率比较差异并无统计学意义($P>0.05$);实施相应护理措施后,两组患者的护理满意度、不良反应发生率、并发症发生率比较差异具有统计学意义($P<0.05$)。**结论** 研究表明,人性化护理模式更适合用于肝病患者的临床护理工作中,且取得了较好的应用成效。从质量上讲,人性化护理提升了肝病患者的临床护理质量;从效率上讲,人性化护理促进了肝病的治愈效率,因此值得临床推广。

【关键词】 人性化护理模式; 肝病患者; 护理满意度; 不良反应

Application of Humanized Nursing Mode in Postoperative Nursing of Liver Cancer Patients

Haiying Wang

Department of Infectious Diseases and Liver Diseases, the First People's Hospital of Yunnan Province, Kunming, Yunnan

【Abstract】 Objective: To explore the application effect of humanized nursing mode in clinical nursing of liver disease patients. **Methods:** Randomly selected 68 patients with liver disease admitted to our hospital from December 2019 to May 2020 as the main body of study, and divided them into a research group and a reference group by digital random method, with 34 cases in each group. Routine nursing intervention was given to the reference group, and the research group adopted a humanized nursing model to compare the nursing satisfaction, incidence of adverse reactions, and incidence of complications between the two groups. **Results:** Before implementing the corresponding nursing measures, there was no statistically significant difference in the nursing satisfaction, incidence of adverse reactions and incidence of complications between the two groups of patients ($P>0.05$); after implementing the corresponding nursing measures, the nursing satisfaction of the two groups of patients There was a statistically significant difference in the degree, incidence of adverse reactions and incidence of complications ($P<0.05$). **Conclusion:** The research shows that the humanized nursing model is more suitable for the clinical nursing of patients with liver disease, and has achieved good application results. In terms of quality, humanized care improves the quality of clinical care for patients with liver diseases; in terms of efficiency, humanized care promotes the cure efficiency of liver diseases, so it is worthy of clinical promotion.

【Keywords】 Humanized Nursing Model; Patients With Liver Disease; Nursing Satisfaction; Adverse Reactions

肝脏是人类机体内最为重要的脏器之一,同时对人体内的正常代谢起到至关重要的积极作用,人一旦患上肝病,那么其各项身体机能与功能指标等多方面均会受到严重的负面影响,对患者身体机能的协调机

制危害性较大。肝病患者如果不能进行及时就诊,导致病情进一步的发展,那么将会对患者自身安全造成极大的威胁,尤其是部分带有极强传染性的肝病。近些年来,国内的肝病发病率逐渐升高,肝病患者的数

量也随之不断增加,基于此,本文随机性抽取我院2019年12月~2020年5月收治的68例肝病患者作为研究主体,具体分为两组,探究人性化护理模式在肝病患者临床护理工作中的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机性抽取我院2019年12月~2020年5月收治的68例肝病患者作为研究主体,采用数字随机法将其分为研究组与参照组,每组建制34例。34例研究组的性别比例:男性患者20例,女性患者14例;年龄阶段:36~64岁,平均年龄(49.56±5.02)岁;病程分布:1.5~7.3年,平均病程(3.96±2.16)年;34例参照组的性别比例:男性患者19例,女性患者15例;年龄阶段:37~65岁,平均年龄(49.97±5.12)岁;病程分布:2~7.5年,平均病程(4.78±2.34)年。两组患者的性别比例、年龄阶段以及病程分布等一般资料比较差异并无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

本次研究中,我院将给予参照组常规护理干预,主要包括入院指导、用药指导、饮食护理、康复训练等多个方面,而研究组则采用个性化护理措施,具体包括健康知识教育、心理护理疏导以及科学饮食计划等等,所有的相关护理工作均以患者为中心展开,比较两组的护理满意度、不良反应发生率、并发症发生率。

1.3 观察指标

本次研究中,我院将以两组患者实施相应护理措施后的临床护理效果作为主要的观察指标,临床护理效果主要包括了患者的护理满意度、不良反应发生率以及合并症发生率等多项指标。为了能够更直观的观察两组患者多项指标之间的差异大小,因此实验小组将患者护理满意度具体分为满意、基本满意以及不满意3个等级,其中满意患者的护理评分>90分,基本满意患者的护理评分<90分,>80分,不满意患者的护理评分<80分。满意度的计算方法:满意度=(满意+基本满意)/总例数×100%。除此之外,将不良反应发生率以及合并症发生率作为辅助观察指标,其中不良反应及并发症发生率的计算方法为:发生率=发生率/总例数×100%。

1.4 统计学处理

采用SPSS20.0统计学软件作为数据处理工具,

主要作用于本次研究中所产生的相关数据信息的统计与分析,利用($\bar{x}\pm s$)表示两组患者之间的计量资料,运用t进行检验;利用(%)表示两组患者之间的计数资料,运用 χ^2 进行检验。当(P<0.05)时,组间比较差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的护理满意度比较

结合表1所示,34例研究组患者中满意层级占21例,基本满意层级占10例,不满意层级占3例,临床护理的总满意度为91.17%;34例参照组患者中满意层级占19例,基本满意层级占9例,不满意层级占6例,临床护理的总满意度为82.35%。实施相应护理措施前,两组患者的护理满意度比较差异并无统计学意义(P>0.05);实施相应护理措施后,两组患者的护理满意度比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者的护理满意度比较(n/%)

组别	例数	满意	基本满意	不满意	满意度
研究组	34	21	10	3	91.17
参照组	34	19	9	6	82.35
P值		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

2.2 两组患者的不良反应发生率比较

结合表2所示,34例研究组患者中有4例发生治疗后不良反应,其余30例并未发生任何不良反应,发生率为11.72%;34李参照组患者中有8例发生治疗后不良反应,其余26未发生任何异常,发生率为23.52%。实施相应护理措施前,两组患者的不良反应发生率比较差异并无统计学意义(P>0.05);实施相应护理措施后,两组患者的不良反应发生率比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组患者的不良反应发生率比较(n/%)

组别	例数	未发生	发生	发生率
研究组	34	30	4	11.72
参照组	34	26	8	23.52
P值		<0.05	<0.05	<0.05

2.3 两组患者的合并症发生率比较

结合表3所示,34例研究组患者中有4例发生相关并发症,其余31例并未发生任何不良反应,发生率为8.82%;34参照组患者中有8例发生相关并发症,其余26未发生任何异常,发生率为23.52%。实

施相应护理措施前,两组患者的并发症发生率比较差异并无统计学意义($P>0.05$);实施相应护理措施后,两组患者的并发症发生率比较差异具有统计学意义($P<0.05$)。

表3 两组患者的并发症发生率比较 (n%)

组别	例数	未发生	发生	发生率
研究组	34	31	3	8.82
参照组	34	26	8	23.52
P 值		<0.05	<0.05	<0.05

3 讨论

随着我国社会经济的飞速增长,促进了我国居民的生活质量,但是从另一方面分析,生活质量的提升较易形成不良生活习惯,尤其是饮食方面。暴饮暴食、长期酗酒等不良嗜好都是形成肝病的主要影响因素,因此近年来国内的肝病发病率一直居高不下,并且部分肝病具备较高的传染性,并引导肝病逐渐朝向多样性演变,为临床的治疗工作增加了一定的难度^[1]。肝病时刻威胁着患者的生命安全,肝病给患者及其家庭带来了极大的危害,从而在很大程度上影响了患者及其家属的生活质量。由此可见,在临床上肝病患者除了有效的治疗之外,还需要给予科学合理的优质护理手段,以此保证患者的生命安全,并且加快患者的病情康复,缩减患者的住院时间。

本次实验主要探究人性化护理措施在肝病患者临床中的应用效果,众所周知,人性化护理模式作为新时期背景下的医疗类产物,一切均为患者着想,所有的治疗及护理措施均以患者作为工作开展的中心点,并且人性化护理自身具备良好的心理护理干预环节以及健康知识教育环节,如此一来,便有助于降低患者的焦虑心理,普及肝病的相关健康知识,防止患者的在临床护理的过程中或者是出院之后,再次发生病情复发或者其他并发症的出现^[2]。从研究过程中得

以看出,较之传统的常规护理干预,人性化护理的心理护理与健康教育能够更有效的缓解患者负面情绪的产生,并且改善患者对肝病健康知识的掌握程度,让患者学会如何灵活运用肝病健康知识,同时深化患者对健康知识的理解,从而进一步的提升患者自身的治疗依从性以及治疗效果^[3]。

综上所述,人性化护理模式更适合用于肝病患者的临床护理工作中,且取得了较好的应用成效。从质量上讲,人性化护理提升了肝病患者的临床护理质量;从效率上讲,人性化护理促进了肝病的治愈效率,因此值得临床推广。

参考文献

- [1] 欧碧英,李结源,唐少梅,何彩勤,张文英.人性化护理在心血管室的应用[J].心血管外科杂志(电子版),2019,8(2):132-133.
- [2] 王敏.人性化护理在精神科的应用[J].中国药物与临床,2019,19(11):1939-1940.
- [3] 肖爱祥,叶君荣,曾君芳,李伟明.电休克治疗病人人性化护理进展[J].全科护理,2019,17(25):3102-3105.

收稿日期: 2020年8月10日

出刊日期: 2020年9月14日

引用本文: 王海英, 人性化护理模式在肝癌患者根治术后护理中的应用[J]. 当代护理, 2020, 1(3): 345-347.

DOI: 10.12208/j.cn.20200113

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网(CNKI Scholar)、万方数据(WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2020 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS