

清单式饮食护理在胃肠 EMR 术后患者中的应用效果研究

罗春妮

广西科技大学第一附属医院 广西柳州

【摘要】目的 探讨清单式饮食管理在胃肠 EMR 术后患者中的应用效果。**方法** 前瞻性随机对照研究，选取 2024 年 6 月至 2025 年 6 月某三甲医院消化内科行胃肠 EMR 术 156 例患者，随机分为观察组和对照组各 78 例。对照组实施常规饮食护理，观察组实施清单式饮食管理，比较两组胃肠道功能恢复时间、并发症发生率、饮食依从性、营养状况及护理满意度。**结果** 观察组术后首次排气时间、首次排便时间、恢复正常饮食时间均短于对照组 ($P<0.05$)；并发症总发生率 (7.69%) 低于对照组 (21.79%) ($P<0.05$)；饮食依从性评分、护理满意度评分及术后第 7 天血清白蛋白、前白蛋白水平均高于对照组 ($P<0.05$)。**结论** 清单式饮食管理能有效促进胃肠 EMR 术后患者康复，降低并发症发生率，改善营养状况，提高护理满意度。

【关键词】 清单式饮食管理；内镜下黏膜切除术；术后护理；加速康复

【收稿日期】 2026 年 8 月 8 日

【出刊日期】 2026 年 9 月 5 日

【DOI】 10.12208/j.cn.20260493

Study on the application effect of checklist-based dietary management in patients after gastrointestinal EMR surgery

Chunni Luo

First Affiliated Hospital of Guangxi University of Science and Technology, Liuzhou, Guangxi

【Abstract】 Objective To investigate the application effect of checklist-based dietary management in patients after gastrointestinal EMR surgery. **Methods** A prospective randomized controlled study was conducted, selecting 156 patients who underwent gastrointestinal EMR surgery in the Department of Gastroenterology of a tertiary hospital from June 2024 to June 2025, and randomly divided into an observation group and a control group, with 78 cases in each group. The control group received conventional dietary care, while the observation group received checklist-based dietary management. The recovery time of gastrointestinal function, incidence of complications, dietary compliance, nutritional status, and nursing satisfaction were compared between the two groups. **Results** The observation group showed shorter postoperative times for first flatus, first defecation, and resumption of normal diet compared to the control group ($P<0.05$). The overall complication incidence rate (7.69%) was lower than that of the control group (21.79%) ($P<0.05$). The scores for dietary compliance, nursing satisfaction, and serum albumin and prealbumin levels on day 7 postoperatively were all higher in the observation group than in the control group ($P<0.05$). **Conclusion** Checklist-based dietary management can effectively promote recovery in patients after gastrointestinal EMR surgery, reduce complication incidence, improve nutritional status, and enhance nursing satisfaction.

【Keywords】 Checklist-based dietary management; Endoscopic mucosal resection; Postoperative care; Enhanced recovery after surgery

1 引言

内镜下黏膜切除术 (EMR) 是治疗胃肠道息肉及早期癌变的标准微创技术，具有创伤小、恢复快等优势^[1-2]。饮食管理作为 EMR 术后护理的核心环节，对

促进创面愈合、预防并发症具有重要意义^[3]。然而，临床实践中 EMR 术后饮食管理仍存在饮食过渡时机缺乏统一标准、患者依从性差等问题^[4-5]。清单式管理通过将复杂流程拆解为关键步骤，确保规范执行，减少人

为差错^[6]。WHO（World Health Organization）于 2008 年推出《手术安全核查表》，使手术并发症和死亡率显著下降^[7]。本研究将清单式管理应用于胃肠 EMR 术后饮食护理，探讨其应用效果。

2 资料与方法

2.1 研究对象

便利抽样选取 2024 年 6 月至 2025 年 6 月某三甲医院消化内科行胃肠 EMR 术患者。纳入标准：（1）年龄 18-75 岁；（2）符合 EMR 手术指征；（3）首次 EMR 治疗。排除标准：（1）严重心、肺、肝、肾功能障碍；（2）凝血功能障碍；（3）糖尿病、炎症性肠病等影响饮食恢复的疾病。

2.2 研究方法

前瞻性随机对照研究，通过医院伦理委员会审批。根据预试验（对照组并发症发生率 25%，观察组预期 10%），设定 $\alpha=0.05$ ， $\beta=0.10$ ，PASS 15.0 计算每组需 72 例，考虑 20%脱落率，最终确定每组 78 例，总样本量 156 例。

2.3 干预方法

对照组：常规饮食护理，术后禁食 24-48 小时，逐步过渡至流质、半流质、软食，口头宣教饮食禁忌。

观察组：清单式饮食管理，组建管理小组，制定《胃肠 EMR 术后饮食管理清单》，包括饮食过渡时间、食物种类、进食量、并发症监测等关键项目，逐项核对执行并签字确认。

2.4 观察指标

主要指标：术后首次排气时间、首次排便时间、恢复正常饮食时间。

次要指标：（1）并发症发生率（出血、穿孔、腹胀、腹痛、感染）；（2）饮食依从性（自制问卷，10 条目，总分 100 分）；（3）营养状况（术后第 1、7 天血清白蛋白、前白蛋白、转铁蛋白）；（4）护理满意度（纽卡斯尔护理满意度量表中文版，19 条目，总分 95 分）。

2.5 统计学方法

SPSS 26.0（Statistical Package for the Social Sciences26.0）分析数据。计量资料以均数±标准差（ $\bar{x}\pm s$ ）表示，组间比较采用独立样本 t 检验；计数资料采用 χ^2 检验；以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 两组患者一般资料比较

两组基线资料比较差异均无统计学意义（ $P>0.05$ ），具有可比性，见表 1。

3.2 两组患者胃肠道功能恢复时间比较

观察组术后首次排气时间、首次排便时间、恢复正常饮食时间均短于对照组（ $P<0.05$ ），见表 2。

3.3 两组患者术后并发症发生率比较

观察组并发症总发生率低于对照组（ $P<0.05$ ），见表 3。

3.4 两组患者饮食依从性及护理满意度比较

观察组饮食依从性评分、护理满意度评分均高于对照组（ $P<0.05$ ），见表 4。

3.5 两组患者营养状况比较

术后第 1 天，两组血清 ALB（Albumin）、PA（Prealbumin）、TRF（Transferrin）水平比较差异无统计学意义（ $P>0.05$ ）；术后第 7 天，观察组 ALB、PA、TRF 水平均高于对照组（ $P<0.05$ ），见表 5。

表 1 两组患者一般资料比较（n=78）

项目	观察组	对照组	t/χ^2 值	P 值
年龄（岁， $\bar{x}\pm s$ ）	52.36±10.28	53.14±9.85	0.482	0.631
性别（男/女，例）	42/36	45/33	0.231	0.631
BMI（kg/m ² ， $\bar{x}\pm s$ ）	23.15±2.68	22.89±2.74	0.612	0.542
息肉部位（胃/结肠，例）	35/43	38/40	0.231	0.631
息肉直径（cm， $\bar{x}\pm s$ ）	1.25±0.42	1.31±0.38	0.925	0.357
手术时间（min， $\bar{x}\pm s$ ）	28.45±8.62	29.13±9.15	0.485	0.629

表 2 两组患者胃肠道功能恢复时间比较（h， $\bar{x}\pm s$ ，n=78）

指标	观察组	对照组	t 值	P 值
首次排气时间	28.35±6.42	36.78±7.15	7.623	<0.001
首次排便时间	48.26±8.35	62.14±9.28	9.845	<0.001
恢复正常饮食时间	96.45±12.36	118.62±15.48	9.982	<0.001

表 3 两组患者术后并发症发生率比较[例(%)，n=78]

并发症类型	观察组	对照组	χ^2 值	P 值
出血	2 (2.56)	8 (10.26)	3.857	0.049
穿孔	0 (0.00)	1 (1.28)	—	0.316*
腹胀	3 (3.85)	6 (7.69)	4.155	0.042
腹痛	1 (1.28)	2 (2.56)	0.339	0.560
合计	6 (7.69)	17 (21.79)	6.370	0.012

注：*Fisher 精确检验。

表 4 两组患者饮食依从性及护理满意度比较（分， $\bar{x}\pm s$ ，n=78）

指标	观察组	对照组	t 值	P 值
饮食依从性评分	88.45±6.32	76.28±8.45	10.124	<0.001
护理满意度评分	89.62±5.18	80.35±7.26	9.256	<0.001

表 5 两组患者营养状况比较（n=78）

指标	时间点	观察组	对照组	t 值	P 值
ALB (g/L)	术后第 1 天	38.25±3.62	37.89±3.45	0.642	0.522
	术后第 7 天	42.15±3.28	39.62±3.56	4.623	<0.001
PA (mg/L)	术后第 1 天	185.36±25.42	182.45±24.86	0.725	0.469
	术后第 7 天	245.68±28.35	218.45±26.48	6.124	<0.001
TRF (g/L)	术后第 1 天	2.15±0.42	2.18±0.38	0.468	0.641
	术后第 7 天	2.48±0.35	2.32±0.36	2.845	0.005

4 讨论

清单式管理将抽象的饮食指导转化为具体执行步骤，避免传统经验式护理的随意性。术后 24-48 小时清流质摄入既满足早期营养支持需求，又避免过早进食固体食物对创面的机械刺激^[8-9]。清单的系统性并发症监测机制实现早期预警和及时干预，明确各阶段饮食质地，控制进食量和速度，减少胃内压力骤升对创面的影响^[10-11]。本研究存在一定局限性：研究样本来源单一，仅纳入本院胃肠 EMR 术后患者，样本量有限，研究结果外推性受限，无法评估该清单式管理对远期营养及胃肠功能的持续影响^[12-15]。

5 结论

清单式饮食管理能有效促进胃肠 EMR 术后患者胃肠道功能恢复，降低并发症发生率，改善营养状况，提高护理满意度，值得临床推广应用。

参考文献

[1] 中华医学会消化内镜学分会. 中国消化内镜诊疗相关肠道准备指南(2023,上海)[J]. 中华消化内镜杂志, 2023,

40(1): 1-12.
[2] 张澍田, 李鹏. 消化内镜下切除术的进展与展望[J]. 中华消化内镜杂志, 2022, 39(5): 321-324.
[3] 陈晓英, 严丽珍. 胃肠息肉内镜治疗术后饮食护理干预与效果分析[J]. 吉林医学, 2020, 41(5): 1265-1266.
[4] 王洛临, 张丽华, 刘霞. 早期肠内营养对胃癌术后患者康复的影响[J]. 中华护理杂志, 2019, 54(8): 1156-1160.
[5] 李怡巍, 龚巧慧, 朱冬梅, 等. 清单式管理在妇科宫颈癌围手术期患者中的应用[J]. 当代护士(下旬刊), 2020, 27(8): 90-91.
[6] 郁蕾,黄慧文,顾巧华.多学科融合下护理流程优化对内镜下治疗患者的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2022, 7(15): 178-180.
[7] 陈雁, 王艳玲. 标准化护理模式在内镜诊疗中的应用研究进展[J]. 护理研究, 2021, 35(12): 2156-2159.
[8] GAUDE A. The Checklist Manifesto: How to Get Things Right[M]. New York: Metropolitan Books, 2010: 15-32.
[9] World Health Organization. WHO Guidelines for Safe

- Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives[M]. Geneva: WHO Press, 2009: 45-58.
- [10] 刘芳, 王欣然, 李莉. 加速康复外科理念在结直肠癌手术患者中的应用[J]. 中华护理杂志, 2021, 56(3): 342-347.
- [11] 张静, 陈丽萍, 赵敏. 清单式管理在 ICU 患者安全管理中的应用[J]. 护理学杂志, 2022, 37(18): 78-80.
- [12] 周英, 罗艳华, 刘雪莲. 清单式护理在消化道出血患者中的应用效果[J]. 当代护士(下旬刊), 2023, 30(2): 112-115.
- [13] 黄丽华, 吴晓英, 张丽. 结构化清单在围手术期护理质量改进中的应用[J]. 护理管理杂志, 2022, 22(8): 589-592.
- [14] 李晓燕, 王芳, 陈静. 清单式管理在老年患者跌倒预防中的应用[J]. 护理研究, 2023, 37(5): 923-926.
- [15] 郑舟军, 戎燕, 王小丽. 清单式饮食管理在食管癌术后患者中的应用[J]. 护理与康复, 2023, 22(4): 45-48.

版权声明: ©2026 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS