

标准化急救护理流程在急诊创伤患者中的应用及对抢救成功率的影响

林 娜

武警安徽总队医院 安徽合肥

【摘要】目的 观察在急诊创伤患者急救过程中开展标准化急救护理流程的效果及对抢救成功率的影响。**方法** 回顾性纳入 2024 年 2 月-10 月进行常规急救护理急诊创伤患者 54 例（作为对照组），并回顾纳入 2024 年 11 月-2025 年 10 月进行标准化急救护理流程护理急诊创伤患者 54 例（作为观察组）。对两组急救各环节用时、抢救成功率以及急救护理质量进行评估。**结果** 急救环节用时，观察组均短于对照组，（ $P<0.05$ ）。抢救成功率，观察组高于对照组，（ $P<0.05$ ）。急救护理质量，观察组高于对照组，（ $P<0.05$ ）。**结论** 对急诊创伤患者开展标准化急救护理，可以提升对该部分患者的急救效率，增加抢救成功率，有助于患者恢复。

【关键词】 标准化急救护理流程；急诊创伤患者；抢救成功率

【收稿日期】 2026 年 5 月 12 日

【出刊日期】 2026 年 6 月 15 日

【DOI】 10.12208/j.jnmn.20260295

Application of standardized emergency nursing process in emergency trauma patients and its impact on rescue success rate

Na Lin

Armed Police Anhui General Hospital, Hefei, Anhui

【Abstract】Objective To observe the effect of implementing standardized emergency nursing procedures in the emergency treatment of trauma patients and its impact on the rescue outcome rate. **Methods** 54 emergency trauma patients who received routine emergency care from February to October 2024 were retrospectively included as the control group, and 54 emergency trauma patients who received standardized emergency care procedures from November 2024 to October 2025 were retrospectively included as the observation group. Evaluate the time, success rate, and quality of emergency care for each stage of two groups of first aid. **Results** The time required for emergency treatment in the observation group was shorter than that in the control group, ($P<0.05$). The success rate of rescue was higher in the observation group than in the control group, ($P<0.05$). The quality of emergency care was higher in the observation group than in the control group, ($P<0.05$). **Conclusion** Standardized emergency care for trauma patients can improve the efficiency of emergency treatment, increase the success rate of rescue, and help patients recover.

【Keywords】 Standardized emergency care process; Emergency trauma patients; Rescue success rate

急诊创伤为当前急诊最常见的病症类型，在临床一直保持有较高的发生率，主要因突发性事故导致，包括车祸、建筑施工损伤等^[1-2]。部分急诊创伤患者损伤较为严重，若未及时得到有效治疗甚至可能危及到患者生命安全。在针对急诊创伤患者救治期间，准确开展各方面护理工作，对于保障急诊对该部分患者的救治效率以及迅速控制患者创伤症状等均存在有重要作用^[3-4]。本次研究主要对急诊创伤患者开展标准化急救护理流程的效果进行观察。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性纳入 2024 年 2 月-10 月进行常规急救护理急诊创伤患者 54 例（作为对照组），并回顾性纳入 2024 年 11 月-2025 年 10 月进行标准化急救护理流程护理急诊创伤患者 54 例（作为观察组）。患者组成方面，对照组男性 28 例、女 26 例，年龄在 31~57 岁间，均值为（ 46.34 ± 1.83 ）岁。其中 14 例患者四肢创伤、16 例为胸部创伤、10 例为颅脑损伤、14 例为腹部创伤。观察组男性 29 例、女 25 例，年龄在 30~58 岁间，均值为（ 46.98 ± 1.68 ）岁。其中 13 例患者四肢创伤、17 例为胸部创伤、13 例为颅脑损伤、11 例为腹部创伤。对患者基本资料对比，（ $P>0.05$ ）。本研究方案已通过我

院伦理委员会审批, 所有参与患者均知情同意。

1.2 方法

1.2.1 对照组

该组在急救过程中开展常规急诊护理。在接触到患者后第一时间对患者各方面情况进行评估, 判断患者损伤严重程度。对于存在外出血患者需及时进行止血处理, 立即开通绿色救治通道, 辅助急救医生对患者实施各方面救治。做好患者治疗期间循环系统护理, 评估患者救治期间各方面指标变化情况, 及时评估是否存在异常等。

1.2.2 观察组

该组患者在急诊救治期间则开展标准化急救护理流程。(1) 创面评估与护理。急诊护理人员在接触到患者后立即对患者各方面情况进行评估, 分析患者损伤部位受损严重程度, 判断是否存在活动性出血。结合患者创面部位具体情况开展针对性处理, 迅速控制患者出血症状。(2) 院内急救。患者在回院途中, 护理人员需准确将患者各方面信息传递给院内, 便于院内急诊科、检验科以及影像科等做好准备, 确保患者在到达医院后能够第一时间对患者开展综合性诊断, 最短时间内制定救治方案。急诊护理人员需要准确配合积极期间的各方面护理配合, 包括血液样本采集、静脉给药管理、患者呼吸道管理以及生命指标监测等, 及时评估患者是否存在异常症状。在救治期间做好患者体温管理, 合理使用加温毯等做好患者救治期间的体温管理。在静脉给药过程中, 需要合理对静脉药液进行预热处理, 避免大量液体进入, 导致患者体温等出现波动。

(3) 无缝隙急诊转运。患者在急诊救治期间, 护理人员需要准确开展无缝隙急诊转运护理。在转运前提前做好各个诊断室工作, 以便提前做好准备, 并合理规划路径, 最大限度缩短急诊转运环节用时。密切监测患者在转运期间呼吸、心率、血压等变化, 判断是否存在异常。

常。(4) 并发症护理。结合患者损伤情况, 评估患者在急诊救治期间可能出现的并发症类型, 判断患者出现各类并发症的风险性, 以便及时进行处理。(5) 用药管理。护理人员需结合患者具体急救方案, 做好患者用药管理。对于颅脑损伤患者, 需要持续关注患者颅内压变化情况, 并评估患者在用药治疗期间各方面症状的改善情况, 一旦出现异常, 则需要及时通知医生进行诊断与处理。(6) 危重症患者。对于病情较为严重患者, 需及时通知急诊 ICU 或者院内专科做好准备, 确保患者在急诊紧急救治后能够最短时间内送至 ICU 或者院内专科进行针对性治疗。

1.3 观察指标

(1) 急救环节用时统计。针对两组患者分诊时间、抢救介入时间、抢救时间以及术前准备时间进行统计。

(2) 抢救成功率对比。对两组抢救成功率进行统计。

(3) 急救护理质量统计。针对两组患者在急诊救治期间急诊护理流程、急救沟通、风险管理以及无菌管理环节护理质量进行评估, 均以百分制进行评定。

1.4 统计学方法

通过 SPSS26.0 对研究期间各方面数据进行分析, 均值±标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示计量资料 (包括急救环节用时、急救护理质量评分等), t 检验, %表示比率等计数资料, χ^2 检验, ($P < 0.05$) 具备统计学意义。

2 结果

2.1 急救环节用时对比

急救环节用时, 观察组均短于对照组, ($P < 0.05$), 见表 1。

2.2 抢救成功率与急救护理质量对比

观察组抢救成功率为 100.00% (54/54), 对照组为 88.89% (48/54), 对比 $\chi^2 = 18.882$, $P = 0.001$ 。急救护理质量, 观察组高于对照组, ($P < 0.05$), 见表 2。

表 1 两组急救环节用时对比 ($\bar{x} \pm s$, min)

组别	例数	分诊时间	抢救介入时间	抢救时间	术前准备
观察组	54	1.52±0.22	9.55±1.85	35.45±2.35	5.63±1.05
对照组	54	2.85±0.15	11.25±1.22	43.36±2.34	7.85±1.34
t	-	12.252	12.141	18.345	14.055
P	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

表 2 两组急救护理质量对比 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	急诊护理流程	急救沟通	风险管理	无菌管理
观察组	54	92.35±2.35	91.65±1.78	93.64±2.15	92.67±2.15
对照组	54	85.34±2.11	86.26±1.98	84.26±2.28	85.64±2.26
t	-	21.252	18.645	21.054	19.344
P	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

3 讨论

急诊创伤患者多因突发性事件导致损伤,部分患者受损较为严重,甚至伴随有多处损伤的情况,存在有一定风险性^[5-6]。在对急诊创伤患者进行急救治疗期间,护理人员需要结合该部分患者特点准确开展各方面急救护理,促使患者可以在最短时间内得到针对性救治^[7-8]。在常规急诊护理的过程中主要结合急诊相关制度以及标准开展各方面护理工作,虽然可以在一定程度上保障对急诊创伤患者的护理效果,但依旧需要进一步进行完善。

将标准化急救护理流程运用到对急诊创伤患者护理的过程中,结合急诊创伤患者的特点对各方面护理措施进行完善,从院前急救到院内急救配合等多个环节进行细化,准确监测患者在救治期间各方面指标变化,结合每位患者损伤情况制定个体化急诊护理措施,能够促使患者在整个急诊救治过程中均可以得到准确、高效的护理,从而达到提升护理效果的作用^[9-10]。本研究中,观察组患者在急诊救治期间各环节用时均短于对照组,且抢救成功率显著提升,各个环节护理质量明显高于常规护理模式下对照组,表明在该护理方案作用下,可以起到对急诊创伤患者护理质量进行提升的作用。

综合研究,在对急诊创伤患者护理过程中可以开展标准化急救护理流程,提升护理效率,增加抢救成功率。

参考文献

- [1] 袁来艳,王凤. 急诊外科应用休克指数评估严重创伤合并失血性休克在急救护理中的应用 [J]. 中国典型病例大全, 2025, 19 (04): 1060-1063.
- [2] 王岩,王素云,王倩,等. 基于创伤复苏时间轴严重创伤病人院内急救护理方案的构建 [J]. 全科护理, 2025, 23 (20):

3925-3932.

- [3] 陆玲. 基于儿童早期预警评分与儿童创伤评分的急救护理对急诊重度创伤患儿急救护理质量的影响 [J]. 妇女儿童健康导刊, 2025, 4 (18): 122-125.
- [4] 牛星波,李盾,张丽娟,等. 危机管理配合无缝隙一体化创伤急救护理模式在外伤急诊急救中的应用价值 [J]. 智慧健康, 2025, 11 (26): 115-117.
- [5] 宋雨轩,杜亚泽. 4R 危机理论的一体化护理在急诊多发性创伤患者急救护理中的应用 [J]. 海南医学, 2025, 36 (14): 2115-2118.
- [6] 陆丽媛,方心怡. 急诊护理时间信息化追踪流程在严重创伤患者中的应用效果 [J]. 医药前沿, 2025, 15 (19): 112-114+118.
- [7] 韩萍,李伟,刘梦珠,等. 基于创伤评分的一体化急救护理模式在急诊多发性创伤患者急救中的应用价值 [J]. 医学临床研究, 2025, 42 (06): 1056-1058.
- [8] 王福英,谢伟山. 无缝隙急救护理对急诊创伤患者救治效率与护理不良事件及满意度的影响 [J]. 岭南急诊医学杂志, 2025, 30 (03): 339-341.
- [9] 魏秀峰,蔡瑞霞,何晓宇. 全流程一体化的急救护理模式在急诊严重创伤患者救治中的应用分析 [J]. 黑龙江中医药, 2025, 54 (03): 376-378.
- [10] 林梅玲. Barthel 指数评估急救护理结合专职化层级护理对急诊创伤骨折患者急救效率及并发症发生率的影响 [J]. 基层医学论坛, 2025, 29 (13): 154-156.

版权声明: ©2026 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS